

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 3週毎 TRA+PTX療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年12月1日				
疾患名	乳癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法					1クール期間	21日		
診療科名	乳腺・甲状腺外科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 局所療法	<input type="checkbox"/> その他					
登録医師名	野村 長久			<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	実施回数	/回				
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント		
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	バクリタキセル投与開始30分前までに内		
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること		
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）		
	テキサート注射液 6.6mg	3	瓶																
4	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋																
5	5%糖液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用 パクリタキセル濃度（0.3～ 1.2mg/mL）になるように調製（液量		
	パクリタキセル注	80～210	mg/m ²																
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで 短縮可能		
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg																
7																			

備考欄

--

減量・中止基準

--

文献

--