

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 GeTTra療法			臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日	2012年12月1日						
疾患名	乳癌			<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験		<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他		1クール期間	21日						
診療科名	乳腺・甲状腺外科							実施回数	/回						
登録医師名	野村 長久														
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	バクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
	テキサート注射液 6.6mg	3	瓶												
4	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	—	—	—	●	—	—	—	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋												
5	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋												
6	5%糖液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用 バクリタキセル濃度（0.3～ 1.2mg/mL）になるように調製（液量
	バクリタキセル注	175	mg/m2												
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	
	ゲムジタビン点滴静注用	1200	mg/m2												
8	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	●	—	—	●	—	初回投与時のみ4mg/kg、2回目以降2mg/kg ※フィルターを通さず投与 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで 短縮可能
	トラスツズマブ点滴静注	4	mg/kg												
9															

備考欄

減量・中止基準

文献