

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 weekly TRA+GEM療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年12月1日				
疾患名	乳癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法					1クール期間	21日		
診療科名	乳腺・甲状腺外科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法								
登録医師名	野村 長久			<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法					<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 局所療法								
				<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> その他					実施回数	/回								
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント		
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—	—			
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること		
	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋																
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶																
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—			
	ゲムジタピン点滴静注用	1250	mg/m2																
3	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—			
	トラスツズマブ点滴静注	4	mg/kg																
	2回目以降2~3		mg/kg																
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2~3mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで 短縮可能		
	グラニセトロン点滴静注	1	袋																
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶																
5	生理食塩液	100	mL				●	—	—	●	—	—	●	—	—	—			
	ゲムジタピン点滴静注用	1250	mg/m2																
	トラスツズマブ点滴静注	4	mg/kg																

備考欄

文献

減量・中止基準

【投与基準】
投与当日のWBC \geq 2000/mm³かつPLT \geq 7万/mm³

【減量基準】

- ・発熱性好中球減少症
- ・PLT $<$ 25000/mm³もしくは、血小板減少に伴う出血のため血小板輸血を実施した場合
- ・非血液毒性 \geq Grade3（悪心、嘔吐、食欲不振を除く）
上記いずれかに当てはまれば次コ-スから1000mg/m²へ減量。
1000mg/m²で同様の事象が発生すれば、800mg/m²へ減量。Day8までの間に上記基準を満たせば、Day8の投与は省略する。