

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 weekly TRA+PTX療法 7日		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年12月1日	
疾患名	乳癌				1クール期間	7日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科						
登録医師名	野村 長久						
			実施回数	/回			

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●										パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●										レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
	ファモチジン注射液 20mg	1	管														
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																	フィルター付き点滴セット使用
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	パクリタキセル注	80~100	mg/m2														初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2~3mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで 短縮可能
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	トラスツスマブ点滴静注	4	mg/kg														
		2回目以降2~3	mg/kg														
7																	

備考欄

減量・中止基準

文献