

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 weekly TRA+PTX療法 28日			臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日	2012年12月1日							
疾患名	乳癌			<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験		<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他		1クール期間	28日							
診療科名	乳腺・甲状腺外科							実施回数	/回							
登録医師名	野村 長久															
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント	
							day1	—	day8	—	day15	—	day22	—		—
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	—	●	—	●	—	—	—	—	バクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	●	—	●	—	●	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	●	—	●	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶													
4	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	●	—	●	—	●	—	—	—	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋													
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	●	—	●	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	バクリタキセル注	80~100	mg/m ²													
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	●	—	●	—	●	—	—	初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2~3mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツズマブ点滴静注	4	mg/kg													
7																

備考欄

減量・中止基準

文献