

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 weekly TRA+VNR療法						登録日	2012年12月1日										
疾患名	乳癌		臨床区分						1クール期間	21日								
診療科名	乳腺・甲状腺外科		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験						実施回数	/回								
登録医師名	野村 長久																	
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント			
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—		—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること		
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン	全開	●	—	—	●	—	—	—	—	—			
	ロゼウス注	25	mg/m2				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	全開	●	—	—	●	—	—	—	—	—	静脈炎予防の為ロゼウス終了後全開で 全量投与すること		
	トラスツズマブ点滴静注	4	mg/kg				●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2~3mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで 短縮可能		
	トラスツズマブ点滴静注	2回目以降2~3	mg/kg				●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	
							●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	

備考欄

文献

減量・中止基準

【中止基準】
白血球数<2000/mm3

【減量基準】

好中球減少を疑う所見が現れた場合には、次コース 20mg/m2に減量

【肝機能低下症例に対する減量の目安】

T-Bil : 2.1~3.0 mg/dL 50%減量

T-Bil : >3.0 mg/dL 75%減量

参考文献：がん化学療法レジメンハンドブック改訂第7版 p284