

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 維持用量 (MA) フェスコ皮下注射療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2024年2月7日	
疾患名	乳癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科						
登録医師名	高橋 寛敏				実施回数	/回	
適応	HER2陽性の乳癌						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	フェスコ配合皮下注 MA	1	瓶	皮下注射		5分以上	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1)5分以上かけて、2mL/min以下の投与速度で大腿部に皮下注射 2)投与終了後、15分の経過観察を行う 3)薬剤部コメント：シリンジ調製で払い出し 4)前回投与日から6週間以上投与間隔が空く場合には初回投与量(IN)で投与する。
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	

備考欄

大腿部以外には皮下注射しないこと、また前回投与部位からは2.5cm以上離れた部位に投与すること。
注射針は25Gが推奨されている。
定期的に心エコー検査を行うこと。

文献

国際共同第Ⅲ相臨床試験（FeDeriCa試験）
Lancet Oncol.2021;22(1): 85-97

減量・中止基準