

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 DCF療法 (Shydration+771'療法)	臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年9月28日 (2023/2/3改訂)
疾患名	食道癌	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法	1クール期間	21~28日
診療科名	外科	<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	実施回数	/回
登録医師名	常光 洋輔	<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法		
		<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 局所療法		
		<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> その他		

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	day4	day5	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	ml	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	ソルテム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	ml 管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服 (内服不可の場合は、ホスアプレピタン
4	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	2日目で降、午前中内服
5	ソルアセトD輸液 デキササート注射液 6.6mg	500 1.5	ml 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ソルテム3A輸液 デキササート注射液 6.6mg	500 1	ml 瓶	点滴静注	側管	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	生理食塩液 パロゾセトロン静注0.75mg	20 1	ml 瓶	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	5%糖液 ドセタキセル点滴静注液	250 60	ml mg/m2	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	20%マンニトールS注射液	300	ml	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液	250 80	ml mg/m2	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する
11	ソルテム3A輸液	500	ml	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ソルアセトD輸液	500	ml	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	フルオロウラシル点滴静注 ソルテム3A輸液	700 1000	mg/m2 ml	持続点滴	メイン	24h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	ワンバックで調製
14																		

備考欄	
文献	
	減量・中止基準 【DTX】 T-Bil>ULN：投与中止 AST,ALT>1.5×ULNかつALP>2.5×ULN：投与中止 【CDDP：腎障害時の投与量変更例】 Ccr 46-60：25%減量 Ccr 31-45：50%減量 Ccr 30以下：投与中止

参照：がん化学療法レジメンハンドブック第7版 p.476