

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

|        |                              |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |        |            |  |
|--------|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
| レジメン名称 | 食道癌 DTX+CDDP療法 (S.hydration) |  | 臨床区分                                                                                                                                                                                | 抗癌剤適応分類                                                                                                                                                                   | 登録日    | 2012年9月28日 |  |
| 疾患名    | 食道癌                          |  | <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療<br><input type="checkbox"/> 単施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 他施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 市販後臨床研究<br><input type="checkbox"/> 治験 | <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法<br><input type="checkbox"/> 術後化学療法<br><input type="checkbox"/> 術前化学療法<br><input type="checkbox"/> 局所療法<br><input type="checkbox"/> その他 | 1クール期間 | 21~28日     |  |
| 診療科名   | 外科                           |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 実施回数   | /回         |  |
| 登録医師名  | 常光 洋輔                        |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |        |            |  |

| Rp | 薬品名称                       | 標準投与量      | 単位          | 投与方法 | ルート | 投与時間  | 投与日  |      |      |      |      |   |   |   |   |   | 注意コメント                                      |
|----|----------------------------|------------|-------------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------|
|    |                            |            |             |      |     |       | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | - | - | - | - | - |                                             |
| 1  | 生理食塩液                      | 100        | mL          | 点滴静注 | メイン |       | ●    | —    | —    | —    | —    | — | — | — | — | — | 血管確保用<br>※開始から終了までECGモニターを装着すること            |
| 2  | ソルデム3A輸液<br>静注用マグネソニル      | 500<br>0.5 | mL<br>管     | 点滴静注 | メイン | 60min | ●    | —    | —    | —    | —    | — | — | — | — | — |                                             |
| 3  | アブレヒタントカプセル125mg           | 1          | Cap         | 経口   |     |       | ●    | —    | —    | —    | —    | — | — | — | — | — | 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服<br>(内服不可の場合は、ホスアブレピタン) |
| 4  | アブレヒタントカプセル80mg            | 1          | Cap         | 経口   |     |       | —    | ●    | ●    | —    | —    | — | — | — | — | — | 2日目以降、午前中内服                                 |
| 5  | ソルアセトD輸液<br>デキザート注射液 6.6mg | 500<br>1.5 | mL<br>瓶     | 点滴静注 | メイン | 60min | ●    | —    | —    | —    | —    | — | — | — | — | — |                                             |
| 6  | ソルデム3A輸液<br>デキザート注射液 6.6mg | 500<br>1   | mL<br>瓶     | 点滴静注 | 側管  | 60min | —    | ●    | ●    | —    | —    | — | — | — | — | — |                                             |
| 7  | 生理食塩液<br>パロゾセトロン静注0.75mg   | 20<br>1    | mL<br>瓶     | 静注   | 側管  | 緩徐に   | ●    | —    | —    | —    | —    | — | — | — | — | — |                                             |
| 8  | 5%糖液<br>ドセタキセル点滴静注液        | 250<br>50  | mg/m2       | 点滴静注 | メイン | 90min | ●    | —    | —    | —    | —    | — | — | — | — | — |                                             |
| 9  | 20%マンニトールS注射液              | 300        | mL          | 点滴静注 | メイン | 30min | ●    | —    | —    | —    | —    | — | — | — | — | — |                                             |
| 10 | 生理食塩液<br>ジスプラチン点滴静注        | 250<br>50  | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 90min | ●    | —    | —    | —    | —    | — | — | — | — | — | 全量500mLに調製する                                |
| 11 | ソルデム3A輸液                   | 500        | mL          | 点滴静注 | メイン | 60min | ●    | ●    | ●    | —    | —    | — | — | — | — | — |                                             |
| 12 | ソルアセトD輸液                   | 500        | mL          | 点滴静注 | メイン | 60min | ●    | ●    | ●    | —    | —    | — | — | — | — | — |                                             |
| 13 |                            |            |             |      |     |       |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |                                             |

備考欄

減量・中止基準

文献