

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 FP+RT療法 (S.hydration+ツルナ療法)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年9月28日
疾患名	食道癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	(2023/2/3改訂)	
診療科名	外科					
登録医師名	常光 洋輔					
1クール期間		28日				
実施回数		2/回				

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント	
							day1	day2	day3	day4	—	—	—	—		
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	ソルデム3A輸液 静注用マグネシウム	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	アブレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服 (内服不可の場合は、ホスアプレピタン
4	アブレヒタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服
5	ソルアセトD輸液 デキザン注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	ソルデム3A輸液 デキザン注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	250 70	mL mg/m2	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	全量500mLに調製する
10	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	フルオロウラシル点滴静注 ソルデム3A輸液	700 1000	mg/m2 mL	持続点滴	メイン	24h	●	●	●	●	—	—	—	—	—	ワンバックで調製
13																
14																

備考欄
RT 週5日間 計28回 50.4Gy RT終了まで2コース終了

文献

減量・中止基準
【CDDP：腎障害時の投与量変更例】
Ccr：46-60 25%減量
Ccr：31-45 50%減量
Ccr：30以下 投与中止