

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 mFOLFOX6療法
疾患名	食道癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	住井 遼平

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2025年5月7日
1クール期間	14日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶															
	デキササート注射液 6.6mg	1	瓶															
3	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m2															
4	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m2															
5	5-FU注	400	mg/m2	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチン終了後15分以内で投与終了
	生理食塩液	50	mL															
6	5-FU注	2400	mg/m2	持続点滴	側管	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ワンバック持続（46時間）
	ソルデム3A輸液	2000	mL															
7																		

備考欄
本レジメンはシスプラチン不耐例に対するオプションである

減量・中止基準
【2コース以降の投与可能条件】
好中球数：1500/mm3以上
血小板数：10万/mm3以上
【減量基準】（前回の投与後に発現した有害事象により判断）

文献
・日本食道学会「食道癌に対するオキサリプラチンの使用について」
・Continuation versus discontinuation of first-line chemotherapy in patients with metastatic squamous-cell oesophageal cancer: A randomised phase II trial (E-DIS)