

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 NAC DCF療法 (Shydration+infuser pump)	臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年12月7日
疾患名	食道癌	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日
診療科名	外科			実施回数	3/回
登録医師名	常光 洋輔				
適応	切除可能な局所進行食道扁平上皮癌				

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	-	-	-	-	-	
1	NaCl注射液用100単位/mL注射液 10mL	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤1時間~1時間30分前に内服
4	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中に内服
5	ソルテム3A輸液 静注用マグネシウム	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ソルアセトD輸液 デキサート注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ソルテム3A輸液 デキサート注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
8	生理食塩液 パロプロセドロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	5%糖液 ドセタキセル点滴静注液	250 70	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	250 70	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する
12	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
13	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
14	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	3750 150	mg/m <sup>2</sup> mL	持続点滴	側管	120h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) インフューザーポンプ使用 2) 全量250mLに調製 (5日間持続) 3) 1日750mg/m <sup>2</sup>
15	NaCl注射液用100単位/mL注射液 10mL	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

備考欄  
術前に3コースまで使用する

減量・中止基準

文献  
A randomized controlled phase III trial comparing two chemotherapy regimens and chemoradiotherapy regimen as neoadjuvant treatment for locally advanced esophageal cancer, JCOG 1109 NEXt study