

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 Nivolumab+Ipilimumab療法	
疾患名	食道癌	
診療科名	内科	
登録医師名	住井 遼平	
適応	根治切除不能な進行再発食道癌の一次治療	

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2022年7月19日
1クール期間	42日
実施期間	最長24ヶ月

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	day22	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 オブジーボ点滴静注	64 360	mL mg/body	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	※インラインフィルターを使用すること。 ※投与終了後30分経過観察すること。
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オブジーボ投与後、経過観察用
4	生理食塩液 ヤーボイ点滴静注液	50 1	mL mg/kg	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること。 全量30mLに調製する。 (1~4mg/mLの濃度に希釈すること) ※ミキシング時にボトル内を過度に陰圧にしないこと

備考欄
本レジメンの投与期間は投与開始から最長で24ヶ月とする。

減量・中止基準
オブジーボ・ヤーボイ AEマネジメントブック 食道癌編

文献
Check Mate 648試験
Doki.Y, et al, N Engl J Med 2022 ; 386 : 449-462