

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 Pembro+FP療法 (S.hydratation+infuserpump)
疾患名	食道癌
診療科名	外科
登録医師名	常光 洋輔
適応	根治切除不能な進行再発食道癌の一次治療

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2022年2月3日
1クール期間	21日
実施回数	最大6回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-		-
1	パリアナ0.75mg/100単位/mL注射液 10mg	1	本	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ投与後フラッシュ用
5	ソルデム3A輸液 静注用マグネシウム	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	アプレピタント	125	mg	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シスプラチン投与の1時間~1時間半前に服用 ※内服が出来ない場合は点滴に切り替え
7	アプレピタント	80	mg	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	午前中に服用
8	ソルアセトD輸液 デキザート注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ソルデム3A輸液 デキザート注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	生理食塩液 パロプセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	250 80	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する
13	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	4000 150	mg/m <sup>2</sup> mL	持続点滴	ポート	120h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1)インフューザーポンプ使用 2)全量250mLに調製(5日間持続) 3)1日800mg/m <sup>2</sup>
16	パリアナ0.75mg/100単位/mL注射液 10mg	1	本	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KEY-Note590試験  
※6クール施行後は「Pembro+FU維持療法」に切り替えること