

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 Pembro+FP療法 (S,hydration+ワンバック法)	
疾患名	食道癌	
診療科名	外科	
登録医師名	常光 洋輔	
適応	根治切除不能な進行再発食道癌の一次治療	

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2022年2月3日
1クール期間	21日
実施回数	最大6回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ投与後フラッシュ用
4	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	アプレピタント	125	mg	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シスプラチン投与の1時間～1時間半前に服用 ※内服が出来ない場合は点滴に切り替え
6	アプレピタント	80	mg	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	午前中に服用
7	ソルアセトD輸液 デキサード注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	ソルデム3A輸液 デキサード注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
9	生理食塩液 パロプセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	250 80	mL mg/m2	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する
12	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
13	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
14	フルオロウラシル点滴静注 ソルデム3A輸液	800 1000	mg/m2 mL	持続点滴	メイン	24h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	ワンバックで調製

KEY-Note590試験
※6クール施行後は「Pembro+FU維持療法」に切り替えること