

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胆道癌 GCS (GEM+CDDP-S-1) 療法
疾患名	胆道癌
診療科名	肝臓内科
登録医師名	坂田 雅浩

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2018年5月2日
1クール期間	14日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	day8	-	-	-	-	-	-	
1	S-1			経口			●	→	→	休							day1~7内服 投与量は備考欄を参照
2	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●										血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること 抗癌剤投与前後で分割化
3	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg デキサード注射液 6.6mg	100 1 1.5	mL 瓶 瓶	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 ゲムシタピン点滴静注用	100 1000	mL mg/m ²	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	500 25	mL mg/m ²	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6																	

備考欄	
S-1用量	BSA < 1.25m ² = 80mg/body 1.25m ² ≤ BSA < 1.5m ² = 100mg/body BSA ≥ 1.5m ² = 120mg/body

文献	A multi-institution phase II study of gemcitabine/cisplatin/S-1 (GCS) combination chemotherapy for patients with advanced biliary tract cancer (KHBO1002)
----	---

減量・中止基準
【投与開始基準】 Day1：好中球数 ≥ 1500、血小板数 ≥ 10万、AST ≤ 150、ALT ≤ 150、T-Bil ≤ 3.0mg/dL、CRE ≤ 1.2mg/dL
【減量基準】 好中球数Grade4、血小板数Grade4 → GEM：1段階減量、S-1：減量なし 発熱性好中球減少症 → GEM：1段階減量、S-1：減量なし CRE ≥ 1.5mg/dL → GEM：減量なし、S-1：1段階減量
【減量方法】 GEM：1000mg/m ² → 800mg/m ² → 600mg/m ² → 20%ずつ減量 S-1：120mg → 100mg/day、100mg → 80mg/day、80mg → 60mg/day