

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胆道癌 GEM+S-1療法	
疾患名	胆道癌	
診療科名	外科	
登録医師名	稲垣 優	

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	-	-	day8	-	-	day14	-	-		-
1	S-1	80	mg	経口			●	→	→	→	→	→	休				
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用
3	グラニセトロン点滴静注液1mgバック デキササート注射液 6.6mg	1 1	袋 管	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 ゲムシタピン点滴静注用	100 1000	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
5																	

備考欄  
S-1用量:【BSA】 1.5m<sup>2</sup>以上:100mg/day 1.25~1.5m<sup>2</sup>:80mg/day 1.25m<sup>2</sup>未満:  
60mg/day

文献

減量・中止基準

【投与開始基準】  
初回Day1: 好中球数 $\geq$ 1500、血小板数 $\geq$ 10万、AST $\leq$ 150、ALT $\leq$ 150、T-Bil $\leq$ 3.0mg/dL、CRE $\leq$ 1.2mg/dL  
(※減量処置なしの場合はAST/ALT $\leq$ 100、T-Bil $\leq$ 2.0mg/dL)  
2コース目以降Day1: 好中球数 $\geq$ 1000、血小板数 $\geq$ 7.5万、AST $\leq$ 150、ALT $\leq$ 150、T-Bil $\leq$ 3.0mg/dL、CRE $\leq$ 1.2mg/dL  
2コース目以降Day8: 好中球数 $\geq$ 1000、血小板数 $\geq$ 7.0万、CRE $\leq$ 1.5mg/dL

【減量基準】  
好中球数Grade4、血小板数Grade4 $\rightarrow$ GEM: 1段階減量、S-1: 減量なし  
発熱性好中球減少症 $\rightarrow$ GEM: 1段階減量、S-1: 減量なし  
CRE $\geq$ 1.5mg/dL $\rightarrow$ GEM: 減量なし、S-1: 1段階減量

【減量方法】  
GEM: 1000mg/m<sup>2</sup> $\rightarrow$ 800mg/m<sup>2</sup> $\rightarrow$ 600mg/m<sup>2</sup> $\rightarrow$ 中止  
S-1: 100mg/day $\rightarrow$ 80mg/day $\rightarrow$ 60mg/day $\rightarrow$ 50mg/day $\rightarrow$ 中止

レジメンハンドブック第7版 p.650-651