

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胆道癌 Pembrolizumab+ (GEM+CDDP) 療法
疾患名	胆道癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	野間 康宏
適応	治癒切除不能な胆道癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2024年6月5日
1クール期間	21日
実施回数	8/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント		
							day1	-	-	day8	-	-	-	-		-	-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	キイトルーダ点滴静注	200	mg/body	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※インラインフィルターを使用すること。 ※最終濃度を1~10mg/mlとする。 ※他剤との混合は不可
	生理食塩液	100	mL														
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ投与後フラッシュ用
4	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶														
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m2														
7	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	シスプラチン点滴静注液	25	mg/m2														

備考欄  
最大8サイクルまで使用可能  
8サイクル終了後は「Pembrolizumab+GEM維持療法」へ移行すること

文献  
Pembrolizumab in combination with gemcitabine and cisplatin compared with gemcitabine and cisplatin alone for patients with advanced biliary tract cancer (KEYNOTE-966) : a randomized, double-

減量・中止基準  
【投与開始基準】  
初回Day1：好中球数 $\geq 1500$ 、血小板数 $\geq 10$ 万、AST $\leq 150$ 、ALT $\leq 150$ 、T-Bil $\leq 3.0$ mg/dL、血清Cr $\leq 1.2$  mg/dL  
2コース目以降Day1：好中球数 $\geq 1000$ 、血小板数 $\geq 7.5$ 万、AST $\leq 150$ 、ALT $\leq 150$ 、T-Bil $\leq 3.0$ mg/dL、血清Cr $\leq 1.2$  mg/dL  
2コース目以降Day8：好中球数 $\geq 1000$ 、血小板数 $\geq 7.0$ 万、T-Bil $\leq 3.0$ mg/dL、血清Cr $\leq 1.5$  mg/dL  
【減量基準】  
好中球数Grade4、血小板数Grade4→GEM：1段階減量  
発熱性好中球減少症→GEM：1段階減量  
【減量方法】