

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胆道癌 Pembrolizumab+GEM維持療法
疾患名	胆道癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	野間 康宏
適応	治癒切除不能な胆道癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2024年6月5日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	day8	-	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	キイトルーダ点滴静注	200	mg/body	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※インラインフィルターを使用すること。 ※最終濃度を1~10mg/mlとする。 ※他剤との混合は不可
	生理食塩液	100	mL														
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ投与後フラッシュ用
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	デキサード注射液 6.6mg	1	瓶														
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²														
6																	

備考欄

前治療歴として「胆道癌 Pembrolizumab+GEM+CCDP療法」を行っていることを確認すること。
副作用発現状況に合わせてキイトルーダまたはゲムシタピンの単独療法も可

減量・中止基準

--

文献

Pembrolizumab in combination with gemcitabine and cisplatin compared with gemcitabine and cisplatin alone for patients with advanced biliary tract cancer (KEYNOTE-966) : a randomized, double-