

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	肺癌 FOLFIRINOX療法 (ワンバック法)
疾患名	膵臓癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	表 静馬

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2014年3月20日
1クール期間	14日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサメタゾン注射液 6.6mg	1.5	瓶	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナート投与開始30分後からイリノテカン同時投与開始
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナート投与開始30分後から同時投与開始
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	180	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	フルオロウラシル点滴静注	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカン終了後15分以内で投与終了
	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	フルオロウラシル点滴静注	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ワンバック持続 (46時間)
	ソルデム3A輸液	2000	mL	点滴静注	メイン	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9																		

備考欄  
 2~3日目 アプレピタントカプセル80mg 1日1回 1回1Cap 内服  
 2~4日目 デカドロン錠4mg 1日1回 1回1錠 内服

文献  
 FOLFIRINOX versus Gemcitabina for Metastatic Pancreatic Cancer  
 FOLFIRINOX療法 (治療切除不能な膵癌) 適正使用情報

減量・中止基準  
 好中球数 $\geq$ 1,500/mm<sup>3</sup>  
 血小板数 $\geq$ 75,000/mm<sup>3</sup>  
 発熱性好中球減少、好中球数500未満が7日以上→優先的にイリノテカンを優先的に減量、5-FU急速静注は中止  
 血小板数50,000未満→オキサリプラチンを優先的に減量、5-FU急速静注は中止  
 総ビリルビン2~3mg/dL→CPT-11 120mg/m<sup>2</sup>、3mg/dLを超える場合は90mg/m<sup>2</sup>へ減量  
 減量時の投与量  
 L-OHP: 85mg/m<sup>2</sup>→65mg/m<sup>2</sup>→50mg/m<sup>2</sup>→中止  
 CPT-11: 180mg/m<sup>2</sup>→150mg/m<sup>2</sup>→120mg/m<sup>2</sup>→中止  
 5-FU急速静注: 400mg/m<sup>2</sup>→中止  
 5-FU持続静注: 2400mg/m<sup>2</sup>→1800mg/m<sup>2</sup>→1200mg/m<sup>2</sup>→中止

参照: がん化学療法レジメンハンドブック7版 p665-666 FOLFIRINOXの項