

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	肺癌 NAC GEM+TS-1療法
疾患名	肺癌
診療科名	外科
登録医師名	稲垣 優

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	-	-	day8	-	-	day14	-	-		-
1	S-1	80	mg	経口			●	→	→	→	→	→	休				
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用
3	グラニセトロン点滴静注液1mgバック デキササート注射液 6.6mg	1 1	袋 管	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 ゲムシタピン点滴静注用	100 1000	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
5																	

備考欄  
 用量注意！ S-1用量：【BSA】 1.5m<sup>2</sup>以上：120mg/day 1.25~1.5m<sup>2</sup>：100mg/day 1.25m<sup>2</sup>未満：80mg/day

文献

減量・中止基準  
 S-1  
 Cr60-80：初回投与量（場合により1段階減量）  
 30-60：1段階減量  
 <30：投与中止  
 Grade3の血液毒性：S-1、GEM休薬  
 Grade4の血液毒性：GEM（200mg/m<sup>2</sup>減量）およびS-1は1段階減量

参照：レジメンハンドブック第7版 p674