

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	膵癌 modified FOLFIRINOX療法(ワンバック法)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年3月2日	
疾患名	膵臓癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	14日	
診療科名	外科				実施回数	/回	
登録医師名	内海 方嗣						
適応	局所進行切除不能膵癌						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	アプレビタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶															
4	デキサメタゾン注射液 6.6mg	1.5	瓶	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5%糖液	250	mL															
5	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナート投与開始30分後からイリノテカン同時投与開始
	5%糖液	250	mL															
6	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナート投与開始30分後から同時投与開始
	5%糖液	250	mL															
7	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m ²	点滴静注	メイン	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ワンバック持続(46時間)
	フルオロウラシル点滴静注	2400	mg/m ²															
8	ソルデム3A輸液	2000	mL	点滴静注	メイン													

備考欄
 CPT-11 : 150mg/m²、ホ-ラ抜き。
 2~3日目 77 lit 外Cap80mg、
 2~4日目 デカド 錠4mg 1日1回 1回2錠

文献
 A Phase II study of modified FOLFIRINOX for chemotherapy naïve patients with metastatic pancreatic cancer

減量・中止基準
 2コース目以降投与可能条件
 好中球数 ≥ 1,500/mm³
 血小板数 ≥ 75,000/mm³
 発熱性好中球減少、好中球数500未満が7日以上→優先的にイリノテカンを優先的に減量
 血小板数50,000未満→オキサリプラチンを優先的に減量

減量時の投与量
 L-OHP : 85mg/m²→65mg/m²→50mg/m²→中止
 CPT-11 : 150mg/m²→120mg/m²→90mg/m²→中止
 5-FU持続静注 : 2400mg/m²→1800mg/m²→1200mg/m²→中止

参照: がん化学療法レジメンハンドブック7版 p665 FOLFIRINOXの項