

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	頭頸部癌 <i>biweekly Cetuximab + weekly PTX療法</i>			臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2026年2月4日											
疾患名	頭頸部癌			<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	28日											
診療科名	耳鼻咽喉・頭頸部外科					実施回数	/回											
登録医師名	竹内 薫					適応	転移・再発の頭頸部癌											
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント		
							day1	-	-	day8	-	-	day15	-	-		-	
1	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-		
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶															
	ポラミン注5mg フアモチジン静注20mg	1 1	管 管															
3	生理食塩液	300	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	●	-	-	-		アビタックス投与終了後、1時間は経過観察すること。 2回目以降は経過観察を省略可	
	アビタックス注射液	500	mg/m ²															
4	グラニセトロン点滴静注液1mgバック	1	袋	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-		
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-		フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	100	mg/m ²															
6																		

備考欄

文献

A phase II trial of paclitaxel plus cetuximab for patients with recurrent or metastatic head and neck cancer previously treated platinum-based chemotherapy and anti-PD-1 antibody

減量・中止基準

パクリタキセル
 レベル0 100mg/m² (day1、8、15)
 レベル-1 80mg/m² (day1、8、15)
 レベル-2 60mg/m² (day1、8、15)または80mg/m² (day1、15)

アビタックス
 レベル0 500mg/m² (day1、15)
 レベル-1 400mg/m² (day1、15)
 レベル-2 300mg/m² (day1、15)