

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	頭頸部癌 Pembrolizumab+CBDCA + 5-FU 療法
疾患名	頭頸部癌
診療科名	耳鼻咽喉・頭頸部外科
登録医師名	福島 慶
適応	再発または遠隔転移を有する頭頸部癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2026年2月4日
-----	-----------

1クール期間	21日
--------	-----

実施回数	最大6回
------	------

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-		
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	アプレビタント	125	mg	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カルボプラチン投与の1時間~1時間半前に服用 ※内服が出来ない場合は点滴に切り替え
3	アプレビタント	80	mg	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	午前中に内服
4	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること
5	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ投与後フラッシュ用
6	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg デキサメタゾン注射液 6.0mg	100 1 1.5	mL 瓶 瓶	静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	生理食塩液 カルボプラチン点滴静注液	250 5	mL AUC	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	1000 500	mg/m2 mL	持続点滴	メイン	24h	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	

備考欄

※6クール施行後や骨髄抑制を鑑みて「頭頸部癌 Pembrolizumab療法」に切り替えても良い。
※事前にPD-L1陽性の有無を確認すること

減量・中止基準

文献

KEYNOTE-048試験