

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌【初回】Zolbetuximab+mFOLFOX6療法 (ワンバック)
疾患名	胃癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	住井 遼平
適応	HER2(-)、CLDN18.2(+)の進行再発胃癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2024年7月3日
2026/1/7 改訂	
1クール期間	14日
実施回数	1/回

Rb	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日														注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること		
2	生理食塩液 ホウライミン注5mg パロプセトロン静注用0.75mg デキサゾード注射液 6.6mg アロカリス点滴静注235mg	100 2 1 1.5 1	mL 管 管 管 管	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	制吐剤終了後メインルートフラッシュ必要		
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ピロイ投与前、ルートフラッシュ用		
4	生理食塩液 注射用水 ピロイ点滴静注用100mg	適宜 適宜 800	mL mL mg/m2	点滴静注	側管	適宜	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※投与量は体表面積の小数点第一位まで計算し、第二位以下は切り下げる ※希釈後濃度は2mg/mLとなるよう医師・薬剤師で注射用水・生食量を調整すること ※他剤との混合は不可 ※投与開始前まで冷所で保管し、使用前に室温に戻すこと。まだ投与開始後12時間以内に投与を完了すること ※投与速度に関しては指示簿参照		
5	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ピロイ投与後、ルートフラッシュ用		
6	5%糖液 レボホリナート点滴静注用	250 200	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時に		
7	5%糖液 オキサリプラチン点滴静注	250 85	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時に		
8	フルオロウラシル注 生理食塩液	400 50	mg/m2 mL	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチン終了後15分以内で投与終了		
9	フルオロウラシル注 ソルデム3A輸液	2400 2000	mg/m2 mL	持続点滴	側管	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ワンバック (46時間)		
10								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

備考欄
CLDN18.2が陽性であることを確認すること。ピロイ用の指示簿が入力されていることを確認すること。
制吐剤として投与前日からのオランザピン5mgの併用を考慮すること（糖尿病に禁忌）。
day2以降のデキサメタゾン8mgは別途処方必要。状況に応じてアルプラゾラムの併用可。

減量・中止基準
[]

文献
Zolbetuximab plus mFOLFOX6 in patients with CLDN18.2-positive, HER2-negative, untreated, locally advanced unresectable or metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma (SPOTLIGHT): a multicentre, randomized, double-blind, phase 3 trial

sheet4にピロイ調製用一覧表あります！