

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌 Pembro+FP療法 (Shydration+ワンバック)
疾患名	胃癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	住井 遼平
適応	HER2(-)、進行再発胃癌の一次治療

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2024年7月3日
1クール期間	21日
実施回数	

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること
	キイトルーダ点滴静注	200	mg															
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ投与後フラッシュ用
4	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	静注用マグネソール	0.5	管															
5	アプレピタント	125	mg	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シスプラチン投与の1時間~1時間半前に服用 ※内服が出来ない場合は点滴に切り替え
6	アプレピタント	80	mg	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	午前中に服用
7	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサード注射液 6.6mg	1.5	瓶															
8	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサード注射液 6.6mg	1	瓶															
9	生理食塩液	20	mL	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注O.75mg	1	瓶															
10	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する
	シスプラチン点滴静注液	80	mg/m2															
12	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	フルオロウラシル点滴静注	800	mg/m2	持続点滴	メイン	24h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	ワンバックで調製
	ソルデム3A輸液	1000	mL															

備考欄
一次治療前に可能な限りPD-L1検査を実施することが望ましい。

減量・中止基準

文献
Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for HER2-negative advanced gastric cancer (KEYNOTE-859): a multicentre, randomised, double-blind, phase 3 trial