

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌 Pembro+SOX (L-OHP: 130mg/m ²) 療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2024年6月5日
疾患名	胃癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日
診療科名	外科				実施回数	/回
登録医師名	大塚 真哉					
適応	HER2(-)、進行再発胃癌の一次治療					

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	day14	-	-	-		
1	S-1	80~120	mg	経口			●	→	→	→	→	→	休				備考欄参照	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※インラインフィルターを使用すること。 ※最終濃度を1~10mg/mlとする。 ※他剤との混合は不可
	キイトルーダ点滴静注	200	mg/body															
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ投与後、ルートフラッシュ用
5	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶															
	生理食塩液	100	mL															
6	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S-1が処方されているか確認すること。
	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²															

備考欄
 一次治療前に可能な限りPD-L1検査を実施することが望ましい。
 S-1 2×(14)MA 内服処方
 1.25m²未満 80mg/日、1.25~1.5m²未満 100mg/日、1.5m²以上 120mg/日

減量・中止基準

文献
 Safety and efficacy of pembrolizumab in combination with S-1 plus oxaliplatin as a first-line treatment in patients with advanced gastric/gastroesophageal junction cancer: Cohort 1 data from the KEYNOTE-659 phase IIb study