

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌 PTX (biweekly) +S-1療法
疾患名	胃癌
診療科名	外科
登録医師名	常光 洋輔

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	42日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント		
							day1	-	day8	-	-	day22	-	day28		-	-
1	S-1	80	mg/m ²	経口			●	→	→	→	→	-	→	休			
2	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	パクリタキセル投与開始30分前までに内
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
4	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg パチオン静注 20mg	100 1 1	mL 瓶 管	点滴静注	側管	15min	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
5	グラニセトロン点滴静注液1mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	
6	生理食塩液 パクリタキセル注	250 90	mL mg/m ²	点滴静注	側管	60min	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用 S-1が処方されているか確認すること
7																	

備考欄

減量・中止基準

文献