

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌 SOX(S-1+L-OHP) : 100mg/m ² 療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年8月4日	
疾患名	胃癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日	
診療科名	外科				実施回数	/回	
登録医師名	岩川 和秀						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	-	-	day8	-	-	day14	-	-		-
1	S-1			経口			●	→	→	→	→	→	休				
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	グラニセトロン点滴静注液1mgパック デキササート注射液 6.6mg	1 2	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5%糖液 オキサリプラチン点滴静注液	250 100	mL mg/m ²	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S-1が処方されているか確認すること
5																	
6																	

備考欄

S-1 2×(14)MA 内服処方
 1.25m²未満 40mg/回、1.25m²以上1.5m²未満 50mg/回
 1.5m²以上 60mg/回 day1夕~day15朝

文献

減量・中止基準

【S-1休薬・再開基準】
 ※15日目までに回復しない場合は次コースまで休薬
 (休薬基準) (再開基準)
 好中球数<1000/mm³ 好中球数≥1500/mm³
 血小板数<50000/mm³ 血小板数≥50000/mm³
 AST・ALT>ULN×2.5 AST・ALT≤ULN×2.5
 (肝転移がある場合はULN×5)
 血清クレアチニン>ULN×1.2 血清クレアチニン≤ULN×1.2

【減量・中止基準】→下記の場合はL-OHP,S-1ともに1段階減量
 ・好中球数<500/mm³
 ・発熱性好中球減少症(好中球<1000/mm³かつ腋窩温38℃以上)
 ・血小板数<25000/mm³
 (day29で血小板数<75000mm³のとき、L-OHP : 50mg/m²の場合のみ、S-1は1段階減量)

【減量方法】
 (L-OHP)
 1段階減量 : 75mg/m² 2段階減量 : 50mg/m²

(S-1)
 ・BSA<1.25m²未満
 1段階減量 : 25mg/回 2段階減量 : 20mg/回
 ・1.25m²≤BSA<1.5m²
 1段階減量 : 40mg/回 2段階減量 : 25mg/回
 ・1.5m²≤BSA