

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌 SP(S-1+CDDP)療法(S.hydration)
疾患名	胃癌
診療科名	外科
登録医師名	常光 洋輔

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年9月28日 (2023/2/3改訂)
1クール期間	35日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日														注意コメント
							day1	-	-	-	day8	day9	day10	-	day21	-					
1	S-1	80	mg/m ²	経口			●	→	→	→	→	→	→	→	→	休		day1~day21 21日間 14日間休薬			
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること			
3	ソルテム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-				
4	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服 (内服不可の場合は、ホスアプレピタン			
5	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	午前中内服			
6	ソルアセトD輸液 テキサート注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-				
7	ソルテム3A輸液 テキサート注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-				
8	生理食塩液 ハロプロセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-				
9	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-				
10	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	250 60	mL mg/m ²	点滴静注	メイン	90min	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する。 S-1が処方されているか確認すること。 (S-1 day8)			
11	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-				
12	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-				
13																					

備考欄

文献

減量・中止基準

【減量の目安】
(S-1)
・BSA < 1.25m²未満
初回40mg/回→休薬
・1.25m² ≤ BSA < 1.5m²
初回50mg/回→40mg/回→休薬
・1.5m² ≤ BSA
初回60mg/回→50mg/回→40mg/回→休薬

(CDDP)
10mg/m²単位を目安として減量

【腎障害時の投与量変更例(S-1、CDDP)】
Cr_e ≥ 80 → 初回基準量
60 ≤ Cr_e < 80 → 初回基準量 (必要に応じて1段階減量)
※Cr_e < 50における試験結果はない

参照：がん化学療法レジメンハンドブック改訂第7版 P399