

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 FP (1000/75) + RT療法 (S.hydration + ワンバック法)
疾患名	食道癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	稲生 祥子
適応	cStage II、IIIの食道癌 (T4を除く) に対する化学放射線療法

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2024年7月3日
1クール期間	28日
実施回数	最大4回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服 (内服不可の場合は、ホスアプレピタントまたはアロカリスに変更すること)
4	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中内服
5	ソルアセトD輸液 デキザード注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ソルデム3A輸液 デキザード注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	側管	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	生理食塩液 パロプロセトロン静注用0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	適宜 75	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する。
10	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ソルデム3A輸液 フルオロウラシル点滴静注	1000 1000	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	24h	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	ワンバックに調製する。

備考欄  
RT 50.4Gy/28Fr併用 RT終了まで2コース施行、後療法として2コース施行 (計最大4コース)

減量・中止基準  
【CDDP：腎障害時の投与量変更例】  
Cr：46-60 25%減量  
Cr：31-45 50%減量  
Cr：30以下 投与中止

文献  
食道癌診療ガイドライン2022年版  
A Single-Arm Confirmatory Study of Definitive Chemoradiation Therapy Including Salvage Treatment for Clinical Stage II/III Esophageal Squamous Cell Carcinoma (JCOG0909 Study)