

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸癌 BEV+FOLFIRI療法 (ワンバック)
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	岩川 和秀
適応	大腸癌

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	14日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶															
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペバシズマブ 点滴静注	5	mg/kg															
4	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカンは同時に
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m <sup>2</sup>															
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカンは同時に
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m <sup>2</sup>															
6	フルオロウラシル点滴静注	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナート終了後 15分以内で投与終了
	生理食塩液	50	mL															
7	フルオロウラシル点滴静注	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	側管	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ワンバック持続(46時間)
	ソルデム3A輸液	2000	mL															
8																		

備考欄

減量・中止基準  
 5-FU:T-Bil>5.0mg/dLで中止  
 CPT-11:WBC<3000/mm<sup>3</sup>またはPLT<100000/mm<sup>3</sup>の場合には中止  
 または延期

文献