

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸癌 FOLFIRI療法 (infuser pump)
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	岩川 和秀
適応	大腸癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	14日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	NaCl 0.9% 100単位/mLシリンジ 100	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 パロプセドロン静注0.75mg デキサード注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5%糖液 レボホリナート点滴静注用	250 200	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカンは同時に
5	5%糖液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 150	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカンは同時に
6	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	400 50	mg/m2 mL	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナート終了後 15分以内で投与終了
7	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	2400 50	mg/m2 mL	持続点滴	側管	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インフューザーポンプ 全量110mLに調製する。
8	NaCl 0.9% 100単位/mLシリンジ 100	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9																	
10																	
11																	
12																	

備考欄

減量・中止基準
 5-FU:T-Bil>5.0mg/dLで中止
 CPT-11:WBC<3000/mm3またはPLT<100000/mm3の場合には中止
 または延期

文献