

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸癌 FOLFOXIRI療法 (ワンバック)
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	宮宗 秀明
適応	大腸癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	
1クール期間	14日
実施回数	12クール/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	アプレビタントCap	125	mg	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※抗がん剤投与開始1~1時間半前に服用すること
3	アプレビタントCap	80	mg	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	※午前中に内服
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶															
	デキササート注射液 6.6mg	1.5	瓶															
7	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150~165	mg/m ²															
8	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²															
9	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²															
10	フルオロウラシル注	2400~3200	mg/m ²	持続点滴	メイン	48h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ワンバック持続（48時間） 全量115mLに調製する。
	ソルデム3A輸液	4	袋															

備考欄

Phase III Trial of Infusional Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin, and Irinotecan (FOLFOXIRI) Compared With Infusional Fluorouracil, Leucovorin, and Irinotecan (FOLFIRI) As First-Line Treatment for Metastatic Colorectal Cancer: The Gruppo Oncologico Nord Ovest (Falcone A, et al. J Clin Oncol. 2007; 25: 1670-6)

減量・中止基準

5-FU: T-Bil > 5.0 mg/dL で中止
 CPT-11: 白血球数 < 3000/mm³ または 血小板数 < 100000/mm³ の場合には中止または延期
 L-OHP 投与可能条件: 好中球数 > 1500/mm³、血小板数 > 75000/mm³

文献

--