

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸癌 IRIS-BEV (CPT-11 100mg/m <sup>2</sup> ) 療法
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	常光 洋輔
適応	大腸癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	day15	-		-
1	S-1			経口			●	→	→	→	→	→	→	→	休			
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	血管確保用
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバック デキササート注射液 6.6mg	1 1.5	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
4	生理食塩液 ペバシズマブ点滴静注	100 5	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	初回90min 忍容性があれば、2回目60min 3回目以降30min
5	生理食塩液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	500 100	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	S-1が処方されているか確認すること
6																		
7																		

備考欄  
S-1 2×(14)MA 内服処方  
1.25m<sup>2</sup>未満 40mg/回、1.25m<sup>2</sup>以上1.5m<sup>2</sup>未満 50mg/回  
1.5m<sup>2</sup>以上 60mg/回 day1夕～day15朝

文献

減量・中止基準

CPT-11:白血球数<3000/mm<sup>3</sup>または血小板数<100000/mm<sup>3</sup>の場合は、投与中止または延期

<S-1:腎障害時の投与量変更例>

eGFR (ml/min)	80以上	60以上80未満	30以上60未満
	初回基準量	初回基準量 (必要に応じて1段階減量)	原則、1段階以上の減量 (30~40未満は2段階減量が望ましい)

減量	初回基準量(mg/回)	増量(mg/回)
休薬	40	50
休薬←40mg/回	50	60
休薬←40mg/回←50mg/回	60	75