

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | |
|--------|-------------------|
| レジメン名称 | 大腸癌 Panitumumab療法 |
| 疾患名 | 大腸癌 |
| 診療科名 | 外科 |
| 登録医師名 | 岩川 和秀 |
| 適応 | 大腸癌 |

| |
|--|
| 臨床区分 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 |
| <input type="checkbox"/> 治験 |

| |
|------------------------------------|
| 抗癌剤適応分類 |
| <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 局所療法 |
| <input type="checkbox"/> その他 |

| | |
|-------------|-----------|
| 登録日 | 2012年8月4日 |
| ※2025/6/5改訂 | |
| 1クール期間 | 14日 |
| 実施回数 | /回 |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント | |
|----|-----------------------|----------|-------------|------|-----|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| | | | | | | | day1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 2 | 生理食塩液 ベクティビックス点滴静注 | 100 6 | mL mg/kg | 点滴静注 | 側管 | 60min※ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1)ﾊﾞｸﾃﾐｯｸｽ投与終了後、1時間は経過観察すること。 経過観察は2回目以降省略可 2)ｲﾝﾌｧｲﾙﾄｰを使用すること |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考欄
※生理食塩液で希釈後の点滴溶液中の本剤の最終濃度は10mg/mLを超えないこと。本剤は、60分以上かけて点滴静注すること。ただし、1回投与量として1,000mgを超える場合は、日局生理食塩液で希釈し約150mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。

文献

| 減量・中止基準 | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <Panitumumab> | | | |
| Grade3以上の皮膚障害発現時の用量調節の目安 | | | |
| 皮膚障害の発現時の本剤の投与量 | 本剤の投与 | 投与再開の基準 | 本剤の用量調節 |
| 6mg/kg | 投与延期 | 6週間以内にGrade2以下に回復 | 6mg/kgまたは4.8mg/kg |
| 4.8mg/kg | 投与延期 | 6週間以内にGrade2以下に回復 | 3.6mg/kg |
| 3.6mg/kg | 投与中止 | - | - |