

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸癌 UFT/LV + BEV療法
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	宮宗 秀明
適応	大腸癌

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2016年4月6日
1クール期間	28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	-	-	day15	-	-	day21	-	-		-
1	ユーエフティー	300	mg/m ²	経口			●	→	→	→	→	→	休				備考欄参照
2	ホリナート	75	mg	経口			●	→	→	→	→	→	休				備考欄参照
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液 ペバジスマブ点滴静注	100 5	mL mg/kg	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	1-UFティー、ホリナートが処方されているか確認すること。 初回90min、忍容性が確認できれば2回目60min、3回目以降30minでも可
5																	

備考欄

1-UFティー 1日300mg/m² 3×(21) 8時間毎 食事前1時間避けて内服
ホリナート 1日75mg 3×(21) 8時間毎 食事前1時間避けて内服

減量・中止基準

文献

Uracil-Tegafur and Oral Leucovorin Combined With Bevacizumab in Elderly Patients(Aged ≥75 Years) With Metastatic Colorectal Cancer :
A Multicenter,Phase II Trial(Joint Study of Bevacizumab,Oral Leucovorin, and Uracil-Tegafur in Elderly Patients [J-BLUE] Study