

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸癌 初回投与量 (IN) フェスコ皮下注射法	
疾患名	大腸癌	
診療科名	消化器内科	
登録医師名	住井 遼平	
適応	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能なHER2陽性の大腸癌	

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法
<input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2024年12月4日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	フェスコ配合皮下注 IN	1	瓶	皮下注射		8分以上	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1)8分以上かけて、2mL/min以下の投与速度で大腿部に皮下注射 2)投与終了後、30分の経過観察を行う 3)薬剤部コメント：シリンジ調製で払い出し
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

備考欄

大腿部以外には皮下注射しないこと、また前回投与部位からは2.5cm以上離れた部位に投与すること。注射針は25Gが推奨されている。  
定期的に心エコー検査を行うこと。  
フッ化ビリミジン、オキサリプラチン、イリノテカンの使用歴のある患者にのみ投与すること。

減量・中止基準

--

文献

--