

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 <i>Tucatinib+Capecitabine+TRA療法</i>						臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2026年6月3日								
疾患名	乳癌						<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日								
診療科名	乳腺・甲状腺外科								実施回数	/回								
登録医師名	高橋 寛敏																	
適応	化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌																	
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	day14	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能 ※ツカイザとカペシタピンの処方を確認すること
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg															
3	カペシタピン錠300mg		錠	経口			●	→	→	→	→	→	→	→	休		備考欄参照	

備考欄  
 ツカイザ 2×(21)MA 内服処方  
 1回300mg 1日2回 状態に併せて適宜減量  
 カペシタピン 2×(14)MA 内服処方  
 1.36m2未満 1200mg/回、1.36m2以上1.66m2未満 1500mg/回、  
 1.66m2以上1.96m2未満 1800mg/回 1.96m2以上 2100mg/回

減量・中止基準  
 [ ]

文献  
 Tucatinib, Trastuzumab, and Capecitabine for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer