

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | | | | | | |
|--------|---|--|---|---|--------|------------|
| レジメン名称 | 頭頸部癌 術後補助③ Pembrolizumab+CDDP+RT療法(S,hydration) | | 臨床区分 | 抗癌剤適応分類 | 登録日 | 2026年5月13日 |
| 疾患名 | 頭頸部癌 | | <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験 | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他 | 1クール期間 | 21日 |
| 診療科名 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | | | | 実施回数 | 3回 |
| 登録医師名 | 福島 慶 | | | | | |
| 適応 | 切除可能な局所進行頭頸部癌の放射線併用術後補助療法 | | | | | |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント | |
|----|--|--------------|-------------------------|------|-----|--------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | day1 | day2 | day3 | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | 生理食塩液 | 100 | ml | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 2 | キイトルーダ点滴静注 | 200 | mg | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 生理食塩液 | 100 | ml | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50 | ml | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キイトルーダ点滴後、ルート洗浄用 |
| 4 | ソルテム3A輸液 | 500 | ml | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 硫酸Vi _g 補正液1mEq/mL 0.5fl ₂₀ m | 0.5 | 管 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ソルアセトD輸液 デキササード注射液 6.6mg | 500 1.5 | ml 瓶 | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | アプレピタントカプセル125mg | 1 | Cap | 経口 | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シスプラチン投与1時間~1時間30分前に |
| 7 | アプレピタントカプセル80mg | 1 | Cap | 経口 | | | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2日目を降、午前中内服 |
| 8 | ソルテム3A輸液 デキササード注射液 6.6mg | 500 1 | ml 瓶 | 点滴静注 | メイン | 60min | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ソルアセトD輸液 | 500 | ml | 点滴静注 | メイン | 60min | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ソルテム3A輸液 | 500 | ml | 点滴静注 | メイン | 60min | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 生理食塩液 パロゾセトロン静注用0.75mg | 20 1 | ml 瓶 | 静注 | 側管 | 緩徐に | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 20%マンニトールS注射液 | 300 | ml | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 生理食塩液 シスプラチン点滴静注液 | 適宜 80~100 | ml mg/m ² | 点滴静注 | メイン | 120min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全量500mLに調製する。 |
| 14 | ソルテム3A輸液 | 500 | ml | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ソルアセトD輸液 | 500 | ml | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

備考欄

術後再発高リスク群に適用すること
 術後再発高リスク:検体の切除断端陽性またはリンパ節外浸潤陽性
 RT=66Gy/33Frと併用。
 3コース施行後は術後補助③ Pembrolizumab療法へ移行すること

減量・中止基準

文献

Neoadjuvant and Adjuvant Pembrolizumab in Locally Advanced Head and Neck Cancer