

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | |
|--------|--|
| レジメン名称 | 消化器内科 FP + RT療法 (S,hydration + infuser pump) |
| 疾患名 | 食道癌 |
| 診療科名 | 消化器内科 |
| 登録医師名 | 寺尾 正子 |

臨床区分

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 |
| <input type="checkbox"/> 治験 |

抗癌剤適応分類

| |
|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 局所療法 |
| <input type="checkbox"/> その他 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 登録日 | 2012年9月28日 |
| 1クール期間 | 28日 |
| 実施回数 | /回 CRTでCRとなった場合2クールで終了 |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント | |
|----|----------------------------|------------|-------------|------|-----|-------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | | day1 | day2 | day3 | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 2 | ソルデム3A輸液 静注用マグネソール | 500 0.5 | mL 管 | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ソルアセトD輸液 デキサード注射液 6.6mg | 500 0.5 | mL 瓶 | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ソルデム3A輸液 デキサード注射液 6.6mg | 500 0.5 | mL 瓶 | 点滴静注 | メイン | 60min | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 生理食塩液 アロキシ静注用0.75mg | 20 1 | mL 瓶 | 静注 | 側管 | 緩徐に | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 20%マンニトールS注射液 | 300 | mL | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液 | 適宜 70 | mL mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 90min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全量500mLに調製する。 |
| 8 | ソルデム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ソルアセトD輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 生理食塩液 フルオロウラシル点滴静注 | 適宜 2800 | mL mg/m2 | 持続点滴 | メイン | 96h | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インフューザーポンプ使用(4日間持続) 全量200mLに調製する。 |

備考欄
RT 週5日間 計28回 50.4Gy RT終了まで2コース施行

減量・中止基準

文献