

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	呼吸器内科 Ramucirumab+DTX療法
疾患名	非小細胞肺癌
診療科名	呼吸器内科
登録医師名	岡田 俊明

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2016年9月2日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	サイラムザ投与の30min前に内服すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1	瓶 瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	レスタミンと同時投与 (レスタミン内服不可患者には医師に確認)
3	生理食塩液 サイラムザ点滴静注液	適宜調整 10	mL mg/kg	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) フィルター付き点滴セット使用 2) 投与速度: 25mg/minを超えないこと。 3) 1クール目は終了後、1時間観察すること。 ※2クール目以降省略可 4) 投与後、生理食塩液でラインをフラッシュすること。 5) 全量250mLに調製する。
4	生理食塩液 ドセタキセル点滴静注液	250 60	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	60min	●											

備考欄

減量・中止基準

文献  
 Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stageIV non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial  
 A randomized, double-blind, phase II study of ramucirumab plus docetaxel vs placebo plus docetaxel in Japanese patients with stageIV non-small cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy