

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	皮膚科 weekly PTX療法
疾患名	血管肉腫
診療科名	皮膚科
登録医師名	下江 敬生

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年9月20日
1クール期間	7日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	レスタミン錠 10mg	5	錠	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
	ファタフィン静注 20mg	1	管															
4	デキサード注射液 6.6mg	2	瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	グラニセトロン点滴静注液 3mgバック	1	袋															
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	100	mg/m2															
6																		

備考欄

減量・中止基準

文献