

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 GEM+BEV療法
疾患名	卵巣癌
診療科名	婦人科
登録医師名	澤田 麻里

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2015年10月20日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント		
							day1	-	-	day8	-	-	-	-		-	-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック デキサード注射液 6.6mg	1 1	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
3	生理食塩液 ゲムシタピン点滴静注用	100 1000	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 アバスタチン点滴静注用	100 15	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初回90min、忍容が確認できれば、2回目60min、3回目以降 30minに変更可
5																	

備考欄

減量・中止基準

文献

The Efficacy and Toxicity of Bevacizumab in Combination With Gemcitabine in Patients With Recurrenr Ovarian Cancer