

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 Liposomal Doxorubicin (ドキシル) 療法
疾患名	卵巣癌
診療科名	婦人科
登録医師名	早瀬 良二

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保+ドキシル投与前後のライフラッシュ用ルート内洗浄完了できたら投与終了可 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5%糖液 ドキシル注	250 40	mL mg/m2	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) ドキシル投与前後でライフラッシュを行う。 2) 1mg/minの速度で注入 3) ドキシル投与量90mg以上の場合、5%糖液500mLを使用すること。 4) インラインフィルターは使用しないこと。 5) 手足症候群予防のため手足を「クリグ」する。
4																		

備考欄
2020/11/4～ルーキーブ糖液5%100ml→250mlに変更

減量・中止基準

文献