## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

1.5	いいなむ	短1秒 7/	C (DTV) CE	DCA) (DE	1 /s#x:+		1	吃土豆	/\			++.(= +)/2	÷ ; / \			Z×4		004474505
レジメン名称 疾患名		<b>婦人科 TC (PTX+CB</b> 卵巣癌		UUAU *DEV原丛				臨床区分 区 日常診療			Ì	抗癌剤適応分類  ☑ 進行・再発化学療法				효	<b>冰口</b>	2014年1月9日
診療科名								■ 日本砂原 ■ 単施設自主研究				▶ 進行・再発化子療法 「 術後化学療法						
砂原料石 登録医師名		早瀬 良二					一 4 施設自主研究				□ 術前化学療法				1クール期間		21日	
								□ 市販後臨床研究				□ 局所療法						0 / 🗖
								□治験			<b>▽</b> その		▼その他			実施	回数	6/0
Rp	薬品名称		標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間					投与日						注意コメント
- 10	レフタミン	/コーワ錠 10mg	5		32 37372	70 1	12 2 2 2 3 1 - 0	day1		_	_	_	_		_	_		パクリタキセル投与開始30分前までに
1		July Torris		<u> ус</u>	経口			•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	内服
2	生理食塩液	<u> </u>	100	mL	点滴静注	メイン		•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3		え 注射液 6.6mg ン注射液 20mg	100 3 1	mL 瓶 管	点滴静注	側管	15min	•	_	_		_		_	_	_	_	レスタミンと同時投与(レスタミン内服 不可患者には医師に確認)
4	グラニセト	・ロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	•	_	_	_	_	_	_	_	_		
5	生理食塩液パクリタキ		500 175	mL mg/m2	点滴静注	側管	180min	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	フィルター付き点滴セット使用
6	生理食塩液カルボブラ	え チン点滴静注液	250 6	mL AUC	点滴静注	側管	60min	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
7	生理食塩液アバスチン	ī /点滴静注用	100 15	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	•	_	_		_	_	_	_	_	_	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min
8					-													
備考標	備考欄 減量・中止基準													1				

文献 Incorporation of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer