

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 Tweekly (PTX) 療法 (3投1休)
疾患名	
診療科名	婦人科
登録医師名	早瀬 良二

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	-	-	day8	-	-	day15	-	-		-
1	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠	経口			●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
	デキササート注射液 6.6mg	1	瓶														
	ファモチジン注射液 20mg	1	管														
4	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	60	mg/m ²														
6																	

備考欄

減量・中止基準

文献