

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

|        |                        |
|--------|------------------------|
| レジメン名称 | 子宮頸がん Topotecan+CDDP療法 |
| 疾患名    | 子宮頸がん                  |
| 診療科名   | 婦人科                    |
| 登録医師名  | 早瀬 良二                  |

|  |
|--|
| 臨床区分                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究         |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究         |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究         |
| <input type="checkbox"/> 治験              |

|   |
|---|
| 抗癌剤適応分類                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法               |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法               |
| <input type="checkbox"/> 局所療法                 |
| <input type="checkbox"/> その他                  |

|        |            |
|--------|------------|
| 登録日    | 2018年12月5日 |
| 1クール期間 | 21日        |
| 実施回数   | /回         |

| Rp | 薬品名称                        | 標準投与量       | 単位          | 投与方法 | ルート | 投与時間   | 投与日  |      |      |   |   |   |   |   |   |   | 注意コメント |                                  |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----|--------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------------------------------|
|    |                             |             |             |      |     |        | day1 | day2 | day3 | - | - | - | - | - | - | - |        | -                                |
| 1  | 生理食塩液                       | 100         | mL          | 点滴静注 | メイン |        | ●    | ●    | ●    | - | - | - | - | - | - | - | -      | 血管確保用<br>※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 2  | ソルデム3A輸液<br>静注用マグネソール       | 500<br>0.5  | mL<br>管     | 点滴静注 | メイン | 60min  | ●    | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | -      |                                  |
| 3  | ソルアセトD輸液<br>デキササート注射液 6.6mg | 500<br>1    | mL<br>瓶     | 点滴静注 | メイン | 60min  | ●    | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | -      |                                  |
| 4  | アプレタントカプセル125mg             | 1           | Cap         | 経口   |     |        | ●    | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | -      | 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服             |
| 5  | アプレタントカプセル80mg              | 1           | Cap         | 経口   |     |        | -    | ●    | ●    | - | - | - | - | - | - | - | -      | 2日目以降、午前中内服                      |
| 6  | ソルデム3A輸液<br>デキササート注射液 6.6mg | 500<br>0.5  | mL<br>瓶     | 点滴静注 | メイン | 60min  | -    | ●    | ●    | - | - | - | - | - | - | - | -      |                                  |
| 7  | 生理食塩液<br>アロギシ静注用0.75mg      | 50<br>1     | mL<br>瓶     | 点滴静注 | メイン | 全開     | ●    | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | -      |                                  |
| 8  | 生理食塩液<br>ハイガムチン注射用          | 100<br>0.75 | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 30min  | ●    | ●    | ●    | - | - | - | - | - | - | - | -      | ※生食で前後フラッシュをすること                 |
| 10 | 20%マンニトールS注射液               | 300         | mL          | 点滴静注 | メイン | 30min  | ●    | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | -      |                                  |
| 11 | 生理食塩液<br>シスプラチン点滴静注液        | 300<br>50   | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 120min | ●    | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | -      |                                  |
| 12 | ソルデム3A輸液                    | 500         | mL          | 点滴静注 | メイン | 60min  | ●    | ●    | ●    | - | - | - | - | - | - | - | -      |                                  |
| 14 | ソルアセトD輸液                    | 500         | mL          | 点滴静注 | メイン | 60min  | ●    | -    | -    | - | - | - | - | - | - | - | -      |                                  |

備考欄

減量・中止基準

文献  
Phase III Trial of Four Cisplatin-Containing Doublet Combinations in Stage IVB, Recurrent, or Persistent Cervical Carcinoma: A Gynecologic Oncology Group Study (Monk BJ, et al. J Clin Oncol. 2009; 27:4649-55.)