

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 BEV+XELIRI療法
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	宮宗 秀明

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2016年8月3日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	day15	-	-	-	
1	カベシタピン錠300mg	1600	mg/m ²	経口			●	→	→	→	→	→	休				day1 夕食後～day15 朝食後まで
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	グラニセトロン点滴静注液3mgパック デキササート注射液 6.6mg	1 1.5	袋 瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 ペバシズマブ点滴静注	100 7.5	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初回90min 忍容性があれば、2回目 60min 3回目以降30min
5	5%糖液 イリノテカン点滴静注液	500 200	mL mg/m ²	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ゼローダが処方されているか確認すること
6																	

備考欄

ゼローダ 1600mg/m²/day(800mg/m²/回) 2×(14)MA 夕食後より開始
(day1～day15)
《体表面積》
1.31m²未満=1800mg/day、1.31m²以上1.69m²未満=2400mg/day
1.69m²以上2.07m²未満=3000mg/day、2.07m²以上=3600mg/day

減量・中止基準

--

文献

A Phase I / II Study of XELIRI Plus Bevacizumab as Second-Line Chemotherapy for Japanese Patients With Metastatic Colorectal Cancer(BIX Study)