

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 アービタックス療法
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	岩川 和秀

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	7日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 アービタックス注射液	300 400	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2回目以降 250mg/m ² を60minで投与 2回目は生理食塩液250mLに混注 (予備容量: 140mL) ※濃度0.83~4mg/mLになるよう調製する。 アービタックス投与終了後、1時間は経過観察すること。
5		2回目以降250	mg/m2														

備考欄

減量・中止基準

文献